



INHALADOR

Lea todo el prospecto antes de empezar a usar este producto.

Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe utilizar con cuidado este producto para obtener los mejores resultados. Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico.

Composición:

Cada 100 g contiene:

Cinnamomum camphora (Alcanfor)	42.00 g
Mentha Piperita (Mentol)	40.50 g
Gaultheria fragrantissima (Aceite de gaulteria)	12.00 g
Eucalyptus globulus (Aceite de Eucalipto)	0.50 g
Pinus longifolia (Aceite de terpinol)	3.50 g
Myristica fragrans (Aceite de nuez moscada)	0.50 g
Melaleuca leucadendron (Aceite de cajeput)	1.00 g

Presentaciones comerciales:

- Blíster de cartón con pvc transparente x 1 + inserto
- Blíster de cartón con pvc transparente x 6 + inserto

1. Indicaciones terapéuticas

Vaporal Inhalador está indicado en adultos y niños mayores de 6 años para el alivio de la congestión nasal asociada a trastornos alérgicos e infecciosos del tracto respiratorio superior.

2. Posología y forma de administración

Posología

Adultos y niños mayores de 6 años de edad:
Inhalar 1 o 2 veces en cada una de las fosas nasales. Repetir cada 1-2 horas si fuera necesario. No se recomienda en niños menores de 6 años, ni mujeres embarazadas.

Vía de administración: Nasal.

Modo de uso: Desenrosque la tapa, e inhale por las fosas nasales.

3. Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
Niños menores de 6 años.
Mujeres embarazadas.

4. Advertencias y precauciones especiales de empleo:

No utilizar durante más de 7 días consecutivos o sobre zonas extensas. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico.

Para prevenir contagios evite que otras personas utilicen el mismo envase. Evitar el contacto con los ojos.

5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han descrito.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

El alcanfor atraviesa la placenta, por lo que este medicamento no debe utilizarse durante el embarazo.

Lactancia

No hay evidencia que indique que este producto no debe utilizarse durante la lactancia, ya que las cantidades potencialmente absorbidas sistémicamente son muy bajas y rápidamente metabolizadas.

6. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:

Este producto no interfiere en la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas.

7. Sobredosis:

No se ha informado sobre casos clínicamente relevantes de sobredosis con este producto.

La sobredosis es poco probable durante el uso normal del producto, en caso necesario el personal sanitario deberá llevar a cabo un tratamiento sintomático.

La sobredosis puede causar irritación en la piel.

Mal uso:

La ingestión de la solución puede causar síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. El tratamiento es sintomático.

Se ha observado intoxicación aguda después de la ingestión accidental, con náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y vértigo, sensación de calor / sofocos, convulsiones, depresión respiratoria y coma.

Los pacientes intoxicados con síntomas gastrointestinales o neurológicos graves deben ser observados y tratados sintomáticamente. No inducir el vómito en caso de ingestión accidental.

8. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas:

El mentol y alcanfor tienen una acción local en el tracto respiratorio.

El alcanfor es rubefaciente. El mentol proporciona una sensación de descongestión nasal.

Propiedades farmacocinéticas:

El alcanfor atraviesa la placenta al ser administrado por vía oral. El alcanfor es hidroxilado en el hígado para dar lugar a metabolitos de hidroxialcanfor, que se conjugan con el ácido glucurónico.

9. Periodo de validez:

36 meses.

10. Conservación.

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C.

Q.F. Responsable: Romina Redwood.

Reg. San. No.: 517-PNE-0625

Elaborado por:

Prince Care Pharma Pvt. Ltd., Bhavnagar - India.

Para:



Km 14.5 vía a Daule, Calle 28 de Agosto. Guayaquil - Ecuador.